

AINEs prescritos actualmente en las consultas odontológicas

**Francisco José Garcés Bailo. Jessica Patricia Neira Vizcarra.
Margalida María Pizá Bordoy. Gretchen Sara Kagan Stern.**

2º de Grado de Odontología. Facultad de Ciencias Biomédicas. Universidad Europea de Madrid
frangarces7@hotmail.com

Emilio Pintor Holguín

Dpto. de Especialidades Médicas Aplicadas. Facultad de Ciencias Biomédicas.
Universidad Europea de Madrid
emilio.pintor@uem.es

Resumen: Introducción: Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son fármacos de uso común en odontología para el manejo del dolor y de la inflamación. Dado que el grupo de AINEs es un grupo muy heterogéneo y amplio, cada odontólogo y en cada país podría haber diferencias en cuanto a su utilización. El objetivo de este estudio es conocer cuáles son los AINES más utilizados en la consulta odontológica actualmente. Material y Métodos: Estudio descriptivo y observacional. Muestra estudiada: odontólogos en activo que tenían algún tipo de relación (familiar, personal, etc) con estudiantes de 2º odontología de la UEM o con el profesor. La metodología consistió en rellenar una encuesta (mediante entrevista personal o autocumplimentada) donde se incluyeron variables como: edad, sexo, localidad, país y que señalaran los 5 AINES que con más frecuencia prescribían en su consulta. Se recogieron los datos desde Noviembre 2011 - Marzo 2012. Resultados: 70 odontólogos cumplimentaron la encuesta. La edad media fue de 45,2 años (rango 26-62). 42 (60%) eran hombres, 56 (80%) trabajaban en España y 13 (18.6%) en Italia. El 82.8% utilizan como primera opción un AINE del grupo del ácido propiónico (en especial ibuprofeno y dexketoprofeno) y como segunda opción el paracetamol (21.4%). En el subgrupo de odontólogos italianos (13), nimesulide aparece como primera opción en 6 (46,1%). Conclusiones: El ibuprofeno es la actualidad el AINE más utilizado en la consulta odontológica, seguido por el paracetamol. El uso de nimesulide como alternativa al ibuprofeno para los odontólogos de Italia, sugiere una diferencia regional entre los AINES utilizados en España e Italia.

Palabras clave: AINEs. Prescripción. Consulta odontológica.

Oral

Recibido: 11 marzo 2012.
Aceptado: 13 abril 2012.