

Diplopia monocular

Patricia Castillo Benítez

patricastibeni@hotmail.com

Tutor

Enrique González Díaz-Obregón

Resumen:

Diplopia: Visión doble de los objetos. Suele ser binocular y puede ser debida a trastornos de la coordinación de los músculos oculomotores.

Diplopia monocular, también conocida como poliopia: visión doble de los objetos con un solo ojo. La doble visión persiste cuando uno de los ojos se ocluye.

La diplopia monocular puede ser causada por: astigmatismo elevado (curvatura anormal de la cara anterior de la córnea), queratocono (la córnea se adelgaza y cambia de forma, se vuelve más cónica), pterigium (es un crecimiento anormal de tejido conjuntivo sobre la córnea), una catarata (pérdida de transparencia del cristalino), subluxación de cristalino (rotura incompleta de la zónula con el cristalino desplazado por detrás de la pupila), ojo seco y algunos problemas retinianos.

Caso clínico: Mujer de 58 años, acudió a consulta porque presentaba síntomas de diplopia. Se realizó una revisión en la que la paciente no experimentó síntomas de diplopia binocular, si no monocular.

Como la paciente estaba siendo tratada con quimioterapia, ésta diplopia podría ser secundaria a una patología retiniana producida por el tratamiento, pero tras hacer las diferentes pruebas y retinografías, se concluyó que la diplopia era causada por una catarata incipiente que encontramos en el polo posterior. Esta catarata provoca un astigmatismo irregular, el cual pudimos compensar con su graduación y de esta manera disminuir los síntomas de diplopia.

Palabras clave: Diplopia. Poliopia. Catarata. Astigmatismo.

[Caso Clínico](#)

[Póster](#)

Recibido: 25 marzo 2011.

Aceptado: 31 marzo 2011.